

Retiro del equipo de protección personal (EPP) para procedimientos que no generan aerosoles (PGAs)*


Note que la etapa 3 ha sido modificada

Por favor consulte el video que respalda esta publicación:

https://youtu.be/-GncQ_ed-9w

- El EPP debe retirarse en un orden que minimice el riesgo de autocontaminación
- Deben quitarse los guantes, delantales (y protección para los ojos, si se usan) en la habitación o área del paciente

1 Quitarse los guantes. Sostenga la parte exterior del guante con la mano enguantada opuesta: retírelo. Sostenga el guante que se quitó con la mano que aun tiene el guante.



Deslice los dedos de la mano sin guantes debajo del guante en la muñeca.

Envuelva el guante sobre el que ya retiró y deséchelos.



2 Realice higiene de manos.



3 Desate o rompa los lazos del delantal a la altura del cuello y deje que el delantal se pliegue solo.



Rompa los lazos del delantal a la altura de la cintura y deje que se doble/caiga solo, no toque el exterior ya que **está contaminado**. Deséchelo.

Higiene de manos antes del paso 4: limpie sus manos



3A

Limpie sus manos

4 Retire la protección para los ojos si se ha utilizado.

Use ambas manos para manejar las correas, separándolas de su cara y deséchelas.



5 Limpie sus manos



6 Retire el cubrebocas una vez que termine su turno o su trabajo clínico.



Desate o rompa los lazos o resortes inferiores, seguido de los superiores y retírelo tocando únicamente los lazos o resortes, e inclinándose un poco hacia adelante. Desechar. Una vez retirado, NO reutilizar.

7 Lave sus manos con agua y jabón



*For the PPE guide for AGPS please see:

www.gov.uk/government/publications/covid-19-personal-protective-equipment-use-for-aerosol-generating-procedures